



Important à savoir

- Vous pouvez vous sentir **somnolent(e), étourdi(e)** et/ou être pris(e) de **vertiges** après avoir pris du bisoprolol.



Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant la substance active bisoprolol **ralentissent le rythme cardiaque**, ce qui permet au cœur de **pomper plus efficacement**.

Votre médecin peut vous prescrire du bisoprolol en cas :

- d'**hypertension** ;
- de **douleurs dans la poitrine causées par un rétrécissement d'une artère** (angine de poitrine)
- de **battements du cœur rapides ou irréguliers** ;
- de **diminution du fonctionnement du cœur** (insuffisance cardiaque) ;



Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharmainfo.be).

Cette liste reprend tous les médicaments qui contiennent du bisoprolol. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité de bisoprolol il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

La notice contient toutes les informations relatives à votre médicament, comme sa composition ou des informations sur les allergies.

Certains médicaments contiennent d'autres substances actives en plus du bisoprolol. Ces médicaments sont mentionnés ailleurs. Effectuez une [nouvelle recherche](#) pour les retrouver.



Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

Vous **ne devez pas prendre plus de 10 mg (milligrammes) par jour (24 heures)**. Cette dose correspond à la dose maximale généralement recommandée chez l'adulte.

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Vous pouvez prendre le bisoprolol à **n'importe quel moment** de la journée, **avec ou sans nourriture**. Si vous devez prendre ce médicament sur une longue période, il est préférable de prendre ce traitement à **heure fixe**.

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour vous devez prendre le bisoprolol.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Demandez à votre médecin pendant combien de temps vous devez prendre du bisoprolol.

Peut-être devrez-vous continuer à prendre du bisoprolol pour **une longue durée** ou **à vie**. Dans certains cas, le médecin peut décider d'ajuster le traitement ou de passer à un autre médicament.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut également avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent :

- lorsque le cœur bat moins vite que 60 battements par minute ;
- rythme irrégulier du cœur.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise de bisoprolol sont les suivants :

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- fatigue ;
- vertiges et maux de tête, surtout au début du traitement (généralement légers et disparaissent en 1 à 2 semaines) ;
- sensation de froid ou d'engourdissement dans les doigts, les orteils ou le nez ;
- vertiges, en cas de changement de position trop rapide.

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- troubles du sommeil ;
- dépression ;
- pouls trop lent ou irrégulier, aggravation de l'insuffisance cardiaque ;
- douleurs dans les jambes pendant la marche (crampes) ;
- difficultés respiratoires, surtout chez les patients asthmatiques ou ayant des antécédents de problèmes respiratoires.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).



Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Non, vous ne pouvez pas arrêter le traitement au bisoprolol sans avis médical.

L'arrêter **brutalement** peut entraîner une **augmentation de la tension artérielle** et des **besoins en**

oxygène du cœur, ce qui peut provoquer la **réapparition de douleurs dans la poitrine**.

Si vous devez arrêter ce médicament, il est **important de réduire la dose progressivement**, surtout si vous le prenez depuis longtemps.

Consultez **votre médecin ou à votre pharmacien** : ils peuvent vous aider à mettre en place un schéma de sevrage.



Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez la dose suivante de bisoprolol à **l'heure prévue**.

Ne prenez **jamais de double dose** de bisoprolol pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245)**.

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- vertiges ;
- fatigue inhabituelle ;
- respiration sifflante ;
- ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de la tension artérielle ;
- votre cœur pompe moins bien le sang, ce qui peut vous fatiguer davantage ;
- difficulté à faire des efforts physiques et ressentir des douleurs dans la poitrine ;
- hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), ce qui entraîne une sensation de fatigue et de somnolence.



Puis-je conduire un véhicule si je prends ce médicament ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser une machine si vous prenez du bisoprolol, **sauf** si vous :

- vous sentez pris(e) de **vertiges** ;
- vous sentez **fatigué(e)**.

Ces symptômes peuvent surtout se manifester en **début de traitement**, lors d'une **adaptation de la dose** ou si vous consommez de **l'alcool**.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez consommer de l'alcool si vous prenez du bisoprolol, sauf si la prise du médicament vous donne des **vertiges** car l'alcool pourrait les aggraver.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez manger normalement pendant votre traitement au bisoprolol.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alimentation sur le bisoprolol.



Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaite ?

Le bisoprolol est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

On en **sait trop peu** sur la prise de bisoprolol pendant la grossesse pour garantir que son utilisation pendant celle-ci est sans risques. Votre médecin évaluera la gravité de vos symptômes par rapport aux risques pour l'enfant.

Il y a un risque plus important de fausse-couche et d'accouchement prématuré. Votre bébé pourrait avoir une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), un pouls ralenti et un retard de croissance.

Si vous avez de l'hypertension, il est important pour vous et pour votre bébé de prendre un traitement pendant votre grossesse, afin de maintenir une tension artérielle normale.

Vous êtes enceinte ou vous essayez d'être enceinte ? Si c'est le cas, **discutez** de la prise de bisoprolol avec **votre médecin et/ou votre pharmacien**.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

La prise de bisoprolol est **déconseillée pendant la période de l'allaitement**, car on ne sait pas si le bisoprolol passe dans le lait maternel.

Si vous allaitez et que vous devez prendre du bisoprolol, **discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien**.



À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise de bisoprolol peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Le présent aperçu fait uniquement état des interactions **pouvant être graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- certains **anti-inflammatoires** ;
- **l'adrénaline** (dans le traitement d'une réaction allergique grave et qui peut être mortelle) : l'adrénaline fonctionnera moins bien ;
- certains médicaments contre **l'arythmie** ;
- certains médicaments contre **l'hypertension** ;
- certains médicaments contre le **diabète** ;
- certains médicaments en cas d'**asthme**.

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : «[Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas de bisoprolol dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **rythme du cœur lent ou irrégulier ;**
- **hypotension artérielle ;**
- **asthme, respiration sifflante ou autre affection pulmonaire ;**
- **problèmes importants de circulation sanguine** dans les mains ou les pieds (comme dans le syndrome de Raynaud).

La liste complète des situations dans lesquelles vous devez être prudent(e) en cas de prise de bisoprolol se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Gardez toujours ce médicament **hors de la vue et de la portée des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **conditionnement d'origine bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas de médicaments dans l'évier ou les toilettes ni dans la poubelle. Rapportez-les à **votre pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

Ne prenez **pas ce médicament au-delà de sa date de péremption**. Celle-ci se trouve sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

